

НОВЫЙ ИНГИБИТОР ДПП-4



Тражента
(линаглиптин) таблетки
5 мг

Контроль гликемии с заботой о почках¹

**Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа
новый ингибитор ДПП-4 ТРАЖЕНТА обеспечивает:**

Значимое снижение гликемии

- снижение HbA_{1c} на 1,2% к 24 неделе у пациентов с высокими исходным уровнем гликемии²
- сравнимое с препаратом сульфонилмочевяный³

Длительный и надежный контроль гликемии

- снижение HbA_{1c} на 0,8% удерживалось в течение 2 лет⁴

Уникальный профиль безопасности и переносимости

- сравнимый с плацебо⁵

Одна дозировка один раз в день⁶

- не требует коррекции дозы, даже у пациентов с любой степенью нарушения функции почек и печени⁶



⁶В комбинации с метформин и сульфонилмочевяной

1. Groop PH et al. Linaagliptin lowers albuminuria on top of recommended standard treatment for diabetic nephropathy. ADA 2012, 953P (Poster). 2. Owens DR et al. Diabet Med 2011;28:1352-61. 3. Gallwitz B et al. ADA 71st Scientific Sessions, San Diego, June 24-28, 2011. 4. Schiffoffer A et al. Diabetologia 2011;54(Suppl 1):S142. 5. Schertlanger Get al. ADA 71st Scientific Sessions, San Diego, June 24-28, 2011. 6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тражента. Регистрационное удостоверение: ПП-401430 от 12.01.2012.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тражента (в сокращении)
Перед применением препарата показывать ознакомьтесь с полными текстом инструкции по медицинскому применению препарата Тражента.

Регистрационное удостоверение: ПП-401430 от 12.01.2012. Торговое наименование: Тражента. МНН: линаглиптин. Лекарственная форма и состав: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержащие 5 мг линаглиптина. Фармакотерапевтическая группа: гипогликемическое средство – дипептидилпептидаза-4 ингибитор. Фармакологические свойства: линаглиптин является ингибитором фермента дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4), который участвует в инактивации гормонов инкретина – глюкозоподобного пептида 1 типа (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Тражента увеличивает глюкозозависимую секрецию инсулина и снижает секрецию глюкагона, что приводит к нормализации

уровня глюкозы в крови. Показания к применению: сахарный диабет 2 типа в качестве монотерапии – у пациентов с неадекватным контролем гликемии только на фоне диеты и физических упражнений, при непереносимости метформина или при противопоказаниях к его применению вследствие почечной недостаточности, в качестве двухкомпонентной комбинированной терапии с метформин, производными сульфонилмочевяной или тиазидиформам в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и монотерапии этими препаратами, в качестве трехкомпонентной комбинированной терапии с метформин и производными сульфонилмочевяной в случае неэффективности диетотерапии, физических упражнений и комбинированной терапии этими препаратами. Противопоказания: гиперчувствительность к любому компоненту препарата; сахарный диабет 1 типа; диабетический кетоацидоз; беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: рекомендуемая доза составляет 5 мг (1 таблетка) 1 раз в день, утром. Тражента

может приниматься независимо от приема пищи в любое время дня. При пропуске дозы пациенту следует принять препарат как только он об этом вспомнит. Не следует принимать двойную дозу в один день. Побочное действие: частота побочных эффектов при приеме линаглиптина 5 мг была аналогичной частоте побочных эффектов при приеме плацебо. Возможны следующие побочные эффекты: гипотриглицеридемия, кашель, панкреатит, назорингия и др. Особые указания: препарат Тражента противопоказан у пациентов с сахарным диабетом 1 типа или для лечения диабетического кетоацидоза. Частота развития гипотриглицемии в случае применения линаглиптина в виде монотерапии была сопоставима с плацебо. Применение линаглиптина не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг. Условия хранения: при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 2,5 года. Условия отпуска: по рецепту.

Информация для специалистов здравоохранения

На правах рекламы
ООО «Берингер Ингельхайм»
125317, Москва, Ленинградское шоссе, 16А стр. 3, тел: (495) 544 50 44, факс: (495) 544 56 20

RU/CPM/18/70912
Элв Лилли Восток ОАЭ
123317, Москва, Пресненская наб., 10, тел: (495) 258 50 01, факс: (495) 258 50 05